

# A INFECÇÃO PELO HTLV-1 NA CRIANÇA

O HTLV-1 é um retrovírus que se transmite por via sexual, por via vertical (da mãe para o filho, principalmente, pela amamentação) ou pelo uso de agulhas contaminadas.

Na criança pode causar eczema grave e infectado, denominado de dermatite infecciosa associada ao HTLV-1 (DIH) que sempre afeta o couro cabeludo, áreas retro-auriculares e, também, a face, pescoço, as narinas, os pavilhões auriculares, dobras, etc.

As crianças com DIH desenvolvem, frequentemente, a mielopatia associada ao HTLV-1, paraparesia espástica tropical (HAM/TSP). Neste caso, podem apresentar fraqueza e aumento dos reflexos nos membros inferiores, além de incontinência urinária. Menos frequentemente, a mielopatia pode ocorrer em crianças sem a associação com a dermatite infecciosa.



## **RECOMENDAÇÕES:**

- Recomenda-se que os filhos de mães com sorologia positiva para o HTLV-1 recebam, sempre que possível, aleitamento artificial visto que o vírus também é transmitido pelo leite materno.
- Crianças com sintomas sugestivos de mielopatia, com infecções urinárias de repetição e com eczema crônico envolvendo o couro cabeludo devem realizar sorologia para o HTLV-1.
- Crianças ou adolescentes com sorologia positiva para este vírus devem ser encaminhados para dermatologista e neuropediatra com experiência no diagnóstico e conduta destes pacientes.



Contato: Dra. Achiléa Bittencourt, Dra. M. Fátima Paim e Dra. Janeusa Primo  
Ambulatório de Manifestações Infanto-juvenis da infecção pelo HTLV-1  
Funcionamento: Quartas-feiras pela manhã  
Ambulatório Magalhães Neto do Hospital das Clínicas (UFBA)  
Rua Padre Feijó, 240 - 3 andar - Canela - Salvador/BA

Tel.: (71) 3283-8016 - manhã / (71) 3283-8360 / (71) 3176-2228  
E-mail: [achilea@uol.com.br](mailto:achilea@uol.com.br) / [Lfarre@bahia.fiocruz.br](mailto:Lfarre@bahia.fiocruz.br)

