PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
 QUÍMICA DA UFS – 2023.2

CADERNO DE QUESTÕES

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: _____

ATENÇÃO: Favor não colocar o seu nome na prova nem no caderno de respostas. Pois a identificação será feita pelo número de inscrição que deverá ser colocado na primeira folha da prova e em todas as folhas do caderno de respostas.

FICHA DE RESPOSTA

Inorgânica (escolha apenas duas questões)				Analítica (escolha apenas duas questões)			
Questão 1	Questão 2	Questão 3	Questão 4	Questão 5	Questão 6	Questão 7	Questão 8
a b c d e	a b c d e	a b c d e	a b c d e	a b c d e	a b c d e	a b c d e	a b c d e
Orgânica (escolha apenas duas questões)				FQ (escolha apenas duas questões)			
Questão 9	Questão 10	Questão 11	Questão 12	Questão 13	Questão 14	Questão 15	Questão 16
a b c d e	a b c d e	a b c d e	a b c d e	a b c d e	a b c d e	a b c d e	a b c d e

TABELA PERIÓDICA DOS ELEMENTOS

	I A																		0						
1º	1 H 1,0																		2 He 4,0						
2º	3 Li 6,9	4 Be 9,0																	5 B 10,8	6 C 12,0	7 N 14,0	8 O 16,0	9 F 19,0	10 Ne 20,2	
3º	11 Na 23,0	12 Mg 24,3																	13 Al 27,0	14 Si 28,1	15 P 31,0	16 S 32,1	17 Cl 35,5	18 Ar 39,9	
4º	19 K 39,1	20 Ca 40,1	21 Sc 45,0	22 Ti 47,9	23 V 50,9	24 Cr 52,0	25 Mn 54,9	26 Fe 55,8	27 Co 58,9	28 Ni 58,7	29 Cu 63,5	30 Zn 65,4	31 Ga 69,7	32 Ge 72,6	33 As 74,9	34 Se 79,0	35 Br 79,9	36 Kr 84,8							
5º	37 Rb 85,5	38 Sr 87,6	39 Y 88,9	40 Zr 91,2	41 Nb 92,9	42 Mo 95,9	43 Tc (98)	44 Ru 101,1	45 Rh 102,9	46 Pd 106,4	47 Ag 107,9	48 Cd 112,4	49 In 114,8	50 Sn 118,7	51 Sb 121,8	52 Te 127,6	53 I 126,9	54 Xe 131,3							
6º	55 Cs 132,9	56 Ba 137,3	57* La 138,9	72 Hf 178,5	73 Ta 180,9	74 W 183,8	75 Re 186,2	76 Os 190,2	77 Ir 192,2	78 Pt 195,1	79 Au 197,0	80 Hg 200,6	81 Tl 204,4	82 Pb 207,2	83 Bi 209,0	84 Po (209)	85 At (210)	86 Rn (222)							
7º	87 Fr (223)	88 Ra (226)	89** Ac (227)	104 Rf (261)	105 Db (262)	106 Sg (266)	107 Bh (264)	108 Hs (277)	109 Mt (268)	110 Ds (271)	111 Rg (272)														

*	58 Ce 140,1	59 Pr 140,9	60 Nd 144,2	61 Pm (145)	62 Sm 150,4	63 Eu 152,0	64 Gd 157,3	65 Tb 158,9	66 Dy 162,5	67 Ho 164,9	68 Er 167,3	69 Tm 168,9	70 Yb 173,0	71 Lu 175,0
**	90 Th 232,0	91 Pa (231)	92 U 238,0	93 Np (237)	94 Pu (242)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (252)	100 Fm (257)	101 Md (258)	102 No (259)	103 Lr (260)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Programa de Pós-graduação em Química
PPGQ

LEIA AS SEGUINTE INSTRUÇÕES ANTES DE INICIAR A PROVA:

- a) A prova inicia-se às 14:00 h e encerra-se às 18:00 h (impreterivelmente).
- b) O candidato deve assinar a lista de presença.
- c) O candidato deve usar o número de inscrição como identificação em todas as folhas de respostas, ao invés do seu nome. O objetivo deste procedimento é garantir sigilo durante o processo de seleção.
- d) Ao iniciar a prova:
 - (d.1) A prova terá duração de 4 (quatro) horas;
 - (d.2) O caderno de questões contém 16 questões, sendo 4 de cada área: Química Inorgânica (questões 1 a 4); Química Analítica (questões 5 a 8); Química Orgânica (questões 9 a 12) e Físico-Química (questões 13 a 16). Deverão ser respondidas somente 2 questões de cada área, ou seja, o candidato deverá escolher 2 questões de cada para responder;
 - (d.3) O verso das folhas do caderno de questões pode ser destinado a rascunho;
 - (d.4) A resposta a cada questão deverá ser inserida no espaço especificado no caderno de respostas. Não serão corrigidas as questões respondidas no caderno de questões. O caderno de resposta é único e não poderá ser substituído;
 - (d.5) Durante a prova poderá ser necessário o uso de calculadora. Não será permitido o empréstimo de calculadoras ou outros materiais durante o exame;
 - (d.6) O telefone celular deve ser mantido desligado durante o exame;
 - (d.7) Livros de Química ou qualquer tipo de aparelho de comunicação não são permitidos durante as provas;
 - (d.8) Não haverá revisão de prova;
 - (d.9) Todas as questões devem ser respondidas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
 - (d.10) Ao finalizar a prova, o aluno deverá entregar tanto o caderno de questões como a caderno de respostas.

Questão 1) A figura ao lado ilustra a emissão de radiação eletromagnética quando um elétron sofre transição de um nível para outro no átomo de hidrogênio. Para o átomo de hidrogênio, a energia de um dado estado é calculada através da seguinte equação: $E_n = -\frac{13,6 \text{ eV}}{n^2}$. A energia é relacionada com o comprimento de onda (λ) e com a frequência (ν) da radiação por meio da equação $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$, em que h é a constante de Planck ($6,626 \times 10^{-34} \text{ J s}$) e c a velocidade da luz no vácuo ($3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$). Além disso, vale lembrar que $1 \text{ eV} = 1,602 \times 10^{-19} \text{ J}$.

Em relação à figura, considere as afirmações abaixo:

- I- O comprimento de onda do fóton emitido quando o elétron sofre uma transição do estado **A** para o estado **B** é menor do que o comprimento de onda do fóton associado à transição eletrônica entre o estado **B** e o fundamental.
- II- A diferença de energia entre o nível **B** e o estado fundamental é maior do que $2,0 \times 10^{-18} \text{ J}$.
- III- O comprimento de onda da radiação eletromagnética liberada da transição eletrônica do nível **A** para o nível **B** é de 657 nm.
- IV- A frequência do fóton liberado da transição eletrônica envolvendo o estado **A** e o estado fundamental é menor que $1,0 \times 10^{15} \text{ s}^{-1}$.
- V- Quando o elétron no átomo de hidrogênio é descrito pelo estado caracterizado pelo número quântico principal 3, a carga nuclear sentida pelo elétron é menor do que caso fosse descrito pelo estado com $n = 2$.

Assinale a alternativa correta.

- a) Os itens I, II e IV são verdadeiros.
- b) Os itens I, IV e V são verdadeiros.
- c) Somente os itens II e IV são falsos.
- d) Somente os itens I e V são verdadeiros.
- e) Somente os itens II e III são falsos.

Questão 2) A figura abaixo ilustra a dependência da energia potencial com a distância de separação de dois átomos interagentes em duas situações diferentes.

As afirmações dadas abaixo são relacionadas à figura.

- I- A interação entre os átomos descrita pela **curva b** indica que a interação é mais forte do que a observada para os átomos que interagem segundo a **curva a**.
- II- Para dois elementos iguais formando uma ligação química, caso a **curva a** represente os átomos conectados por uma ligação simples, a **curva b** representa uma ligação dupla para os mesmos átomos.
- III- O comprimento da ligação descrita pela **curva a** é maior do que o comprimento da ligação associada à **curva b**, pois em **a** é observada uma maior estabilização.

IV- Para romper a ligação descrita pela **curva b** entre os dois átomos, é necessário fornecer menos energia do que para quebrar a ligação descrita pela **curva a**.

V- Para ambas as curvas, nota-se que para uma distância suficiente grande, tem-se que os átomos não mais interagem e por essa razão a energia potencial entre eles tende a zero.

Assinale a alternativa correta.

- a) Os itens **I**, **II** e **IV** são verdadeiros.
- b) Os itens **I**, **IV** e **V** são verdadeiros.
- c) Somente o item **V** é verdadeiro.
- d) Três itens são falsos.**
- e) Somente os itens **I** e **III** são falsos.

Questão 3) A aplicação do Modelo da Repulsão dos Pares de Elétrons da Camada de Valência (MRPECV) permite estender a Teoria de Lewis e assim obter a geometria molecular. Em adição, para a descrição da ligação química, a Teoria da Ligação de Valência (TLV) leva em consideração apenas a sobreposição dos orbitais atômicos de valência para a formação de uma dada ligação química. Quanto ao MRPECV e à TLV, as seguintes afirmações são dadas:

I- Para uma molécula diatômica orientada ao longo do eixo z, a sobreposição entre os orbitais p_x ou entre os orbitais p_y de cada átomo leva à formação de uma ligação π .

II- Para os compostos CH_4 , H_2O e SO_3^{2-} , é esperada a seguinte ordem crescente quanto ao ângulo de ligação: $\text{CH}_4 < \text{H}_2\text{O} < \text{SO}_3^{2-}$.

III- Mesmo as ligações sendo polares, uma molécula poliatômica pode ser apolar. Este é o caso em especial das moléculas CO_2 e BF_3 .

IV- Caso um composto apresente 4 regiões de densidade eletrônica em torno do elemento central, sendo dois pares de elétrons de ligação e dois pares isolados, tanto o arranjo eletrônico quanto a geometria molecular são angulares.

V- Usando a técnica da hibridização de orbitais atômicos, é possível explicar a formação de uma dada ligação σ N–H na molécula NH_3 através da combinação de um orbital sp^3 do N com o orbital s do H.

Assinale a alternativa correta.

- a) Os itens I, III e V são verdadeiros.**
- b) Três itens são falsos.
- c) Somente o item **V** é verdadeiro.
- d) Os itens **I**, **II**, e **V** são verdadeiros.
- e) Somente os itens **I** e **IV** são falsos.

Questão 4) A figura abaixo ilustra quatro diferentes orbitais moleculares para uma molécula diatômica homonuclear hipotética orientada ao longo do eixo z. Em relação às afirmações abaixo acerca dos orbitais moleculares fornecidos, assinale aquela que estiver correta.

- a) O orbital molecular **a** corresponde à sobreposição frontal de dois orbitais p em fase, enquanto o orbital **b** é o resultado da sobreposição frontal de dois orbitais p fora de fase.
- b) A simetria correspondente ao orbital molecular **a** é do tipo g e do orbital **b** é u e ambos são σ .
- c) **É correto afirmar que o orbital molecular **d** tem menor energia do que o orbital molecular **c**. Além disso, **c** tem simetria g e **d** tem simetria u .**
- d) Os dois orbitais p envolvidos na formação dos orbitais **c** e **d** são os mesmos que formam os orbitais **a** e **b**.
- e) É correto afirmar que a ocupação eletrônica do orbital molecular **c** na molécula tende a aumentar a ordem de ligação, o que resulta em uma diminuição do comprimento de ligação.

Questão 5) Uma amostra de água de 50 cm^3 é analisada para determinar seu conteúdo de cálcio. Após a precipitação de oxalato de cálcio (CaC_2O_4), esse composto é coletado. O precipitado de CaC_2O_4 é aquecido lentamente até $900 \text{ }^\circ\text{C}$. Com o aquecimento, o oxalato inicialmente perde água e forma oxalato de cálcio anidro. À medida que a temperatura continua subindo, o oxalato de cálcio se decompõe e forma carbonato de cálcio (CaCO_3) e monóxido de carbono (CO_2). Considerando que a massa do filtro antes da coleta do precipitado era $25,7932 \text{ g}$, e depois da precipitação, aquecimento e resfriamento, $25,8216 \text{ g}$, qual a massa de cálcio (Ca), em gramas, na amostra aquosa?

- a) **0,0115 g**
- b) 0,0203 g
- c) 0,0259 g
- d) 0,2023 g
- e) 0,0302 g

Questão 6) Uma solução tampão contendo acetato de sódio (CH_3COONa), $0,05 \text{ mol L}^{-1}$, e ácido acético (CH_3COOH), $0,01 \text{ mol L}^{-1}$, foi preparada. Calcule o valor do pH do tampão. Dados: $K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 1,7 \times 10^{-5}$.

- a) 3,5
- b) 4,0
- c) 4,5
- d) **5,5**
- e) 6,0

Questão 7) Um béquer contém uma solução de $0,02 \text{ mol L}^{-1} \text{ KMnO}_4$, $0,005 \text{ mol L}^{-1} \text{ MnSO}_4$, e $0,5 \text{ mol L}^{-1}$ de H_2SO_4 ; um segundo béquer contém $0,15 \text{ mol L}^{-1} \text{ FeSO}_4$ e $0,0015 \text{ mol L}^{-1} \text{ Fe}_2(\text{SO}_4)_3$. Os dois béqueres são conectados por uma ponte salina e os eletrodos de platina são colocados em cada béquer. Os eletrodos são conectados em um voltímetro. Sabendo disso, qual será o potencial da célula, no início da reação?

Dados: $E^\circ(\text{Fe}^{3+}, \text{Fe}^{2+}) = 0,771 \text{ V}$ e $E^\circ(\text{MnO}_4^-, \text{Mn}^{2+}) = 1,51 \text{ V}$

- a) 1,52 V
- b) 0,67 V
- c) 0,79 V
- d) 0,85 V**
- e) 0 V

Questão 8) Uma amostra de 0,4671 g contém bicarbonato de sódio dissolvido. Esta amostra é titulada com uma solução de ácido clorídrico 0,1067 mol L⁻¹, sendo gasto um volume de 40,72 mL. A reação é

Qual o percentual de bicarbonato de sódio na amostra?

- a) 78,1 %**
- b) 39,7 %
- c) 52,4 %
- d) 87,8 %
- e) 68,2 %

Questão 9) Examine as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta.

I- O HCl é um ácido mais forte do que o HBr.

II- O ácido cloroacético (ClCH₂COOH) é um ácido mais forte do que o ácido bromoacético (BrCH₂COOH).

III- A metilamina (CH₃NH₂) é uma base mais fraca do que o metanol (CH₃OH).

IV- O ácido acético (CH₃COOH) é um ácido mais fraco do que o ácido cloroacético (ClCH₂COOH).

- a) Somente as afirmações I e III estão corretas.
- b) Somente as afirmações I e IV estão corretas.
- c) Somente as afirmações II e IV estão corretas.**
- d) Todas as afirmações estão corretas.
- e) Nenhuma das afirmações está correta.

Questão 10) Examine cada par de estruturas abaixo e assinale a alternativa correta.

- a) Em **a** temos um par de estruturas iguais, em **b**, **c** e **d** temos pares de isômeros espaciais.
b) Em **a**, em **b** e em **d** temos um par de estruturas iguais; em **c** temos um par de estruturas que são isômeros constitucionais.
c) Em **a** e em **b** temos um par de estruturas iguais, em **c** o par de estruturas são isômeros constitucionais e em **d** o par de estruturas são isômeros espaciais.
d) Em **a** temos um par de estruturas iguais, em **b** e **d** temos pares de isômeros espaciais e em **c** um par de isômeros constitucionais.
e) Em **a** e em **b** temos um par de estruturas iguais e em **c** e **d** um par de estruturas são isômeros espaciais.

Questão 11) Assinale a alternativa correta em relação à configuração de cada um dos centros estereogênicos identificados pelos números de **1** a **4** nas estruturas abaixo.

- a) 1R, 2R, 3R, 4R.
b) 1R, 2S, 3R, 4R.
c) 1S, 2S, 3S, 4R.
d) 1R, 2S, 3S, 4R.
e) 1S, 2R, 3S, 4S.

Questão 12) Examine as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta.

- I- A reação do (*R*)-2-clorobutano + NaBr produz (*S*)-2-bromobutano via mecanismo S_N2 .
II- A reação do $\text{H}_2\text{C}=\text{CHCH}_2\text{Br}$ + NaOCH_3 produz $\text{H}_2\text{C}=\text{CHCH}_2\text{OH}$ via mecanismo S_N1 .
III- A reação do (*S*)-1-cloro-2-metilbutano + NaBr produz (*R*)-1-bromo-2-metilbutano via mecanismo S_N2 .
IV- A reação do 2-bromo-2-metilbutano + NaOH produz 2-metilbutan-2-ol via mecanismo S_N2 .
V- A reação do 2-cloro-2-metilpropano + NaOH produz majoritariamente 2-metilpropan-2-ol via mecanismo S_N1 .

- a) Somente as afirmações **I** e **II** estão corretas.
b) Somente a afirmação **I** está correta.
c) Somente as afirmações **I** e **IV** estão corretas.
d) Somente as afirmações **II** e **IV** estão corretas.
e) Todas as afirmações estão corretas.

Questão 13) Para a reação de decomposição de primeira ordem de um composto **A**, $2\text{A} \rightarrow \text{P}$, a constante de velocidade é $3,56 \times 10^{-7} \text{ s}^{-1}$ a 298 K. Calcule a meia vida de **A** ($t_{1/2}$). Sabendo que a pressão inicial de **A** é 33,00 kPa, qual a pressão de **A** após 20 min?

Dados: para uma reação $\text{A} \rightarrow \text{P}$ de primeira ordem, $p = p_0 e^{-kt}$ e $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$.

- a) $t_{1/2} = 9,74 \times 10^5 \text{ s}$ e $p = 32,97 \text{ kPa}$
b) $t_{1/2} = 1,95 \times 10^5 \text{ s}$ e $p = 32,99 \text{ kPa}$
c) $t_{1/2} = 1,95 \times 10^5 \text{ s}$ e $p = 32,97 \text{ kPa}$
d) $t_{1/2} = 2,81 \times 10^6 \text{ s}$ e $p = 32,99 \text{ kPa}$
e) $t_{1/2} = 9,74 \times 10^5 \text{ s}$ e $p = 32,99 \text{ kPa}$

Questão 14) Em um sistema em equilíbrio de água líquida e vapor de água em que a temperatura é mantida constante a partir de um banho, admita que o volume é aumentado reversivelmente com T e p constantes. Isso implicará em vaporização de parte da água líquida. Responda se ΔH , ΔS , ΔS_{univ} , e ΔG são grandezas positivas, negativas ou zero.

- a) $\Delta H = 0$; $\Delta S = 0$; $\Delta S_{\text{univ}} = 0$; $\Delta G = 0$
- b) $\Delta H > 0$; $\Delta S > 0$; $\Delta S_{\text{univ}} > 0$; $\Delta G > 0$
- c) $\Delta H > 0$; $\Delta S > 0$; $\Delta S_{\text{univ}} = 0$; $\Delta G = 0$**
- d) $\Delta H = 0$; $\Delta S > 0$; $\Delta S_{\text{univ}} > 0$; $\Delta G = 0$
- e) $\Delta H > 0$; $\Delta S > 0$; $\Delta S_{\text{univ}} > 0$; $\Delta G = 0$

Questão 15) Um tanque contendo 80 dm^3 de nitrogênio gasoso pressurizado a 172 atm e $20 \text{ }^\circ\text{C}$ é deixado ao sol, aquecendo a $140 \text{ }^\circ\text{C}$. Determine a pressão final dentro do tanque (paredes rígidas), w , q e ΔU no processo. Assuma que o $\text{N}_{2(\text{g})}$ se comporta como um gás perfeito com C_{vm} igual a $21,0 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$.

Dados: $R = 0,082 \text{ atm dm}^3 \text{ K}^{-1} \text{ mol}^{-1} = 8,314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$; $pV = nRT$; $dU = dq + dw$; $C_v = dU/dT$ a p constante; $T/\text{K} = T/^\circ\text{C} + 273$.

- a) $p_f = 172 \text{ atm}$; $w = -2,5 \text{ kJ}$; $q = 2,5 \text{ kJ}$; $\Delta U = 0$
- b) $p_f = 242 \text{ atm}$; $w = 0$; $q = 2,5 \text{ kJ}$; $\Delta U = 2,5 \text{ kJ}$
- c) $p_f = 242 \text{ atm}$; $w = 0$; $q = 1443 \text{ kJ}$; $\Delta U = 1443 \text{ kJ}$**
- d) $p_f = 172 \text{ atm}$; $w = -3524 \text{ kJ}$; $q = 0$; $\Delta U = -3542 \text{ kJ}$
- e) $p_f = 242 \text{ atm}$; $w = -1443 \text{ kJ}$; $q = 1443 \text{ kJ}$; $\Delta U = 0$

Questão 16) Em relação ao diagrama de fase da **Figura 1**, indique qual a composição de um destilado (coletado após o topo de uma coluna de destilação fracionada) com uma composição inicial igual a $0,5$.

Figura 1. Diagrama de fase temperatura-composição a partir da mistura de dois líquidos miscíveis (“líquido 1” e “líquido 2”).

- a) $x_1 = 1$
- b) $x_1 = 0$**
- c) Composição do azeótropo ($x_1 = 0,7$)
- d) $x_1 = 0,5$
- e) $x_1 = 0,3$