17º Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia
1º Congresso Ibero-Americano de Fonoaudiologia
Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia
17º Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia e 1º Congresso Ibero-Americano de Fonoaudiologia - Salvador - BA - Brasil - De 21 a 24 de outubro de 2009

Sessão de Temas Livres

COORDENAÇÃO SUCÇÃO-DEGLUTIÇÃO-RESPIRAÇÃO EM RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS

Autor(es) / Coautor(es) : Andréa Monteiro Correia Medeiros, Andréa Monteiro Correia Medeiros, Aretha Tatiane Bernardi, Bárbara Regina Mansano Nagae

O objetivo deste trabalho foi investigar a oferta de dieta por via oral relacionada à idade gestacional, coordenação sucção/deglutição/respiração (S/D/R) e período dispendido (em dias) para retirada total da sonda em recém-nascidos hospitalizados. Para tanto,
fizeram parte da amostra 48 RNPT, com idade gestacional inferior ou igual a 36 6/7 semanas, com peso menor ou igual a 2.500kg e com padrão respiratório estável no momento da observação. Os recém-nascidos foram divididos em dois grupos; sendo o grupo A
correspondente aos RNPT que receberam a dieta por via oral (VO) mamadeira e o grupo B dos que receberam a dieta por via oral copo. Os dados foram colhidos pelas fonoaudiólogas pertencentes ao grupo de especialização em Motricidade Orofacial do Hospital e
Maternidade Neomater, a partir do levantamento dos registros contidos nos prontuários fonoaudiológicos utilizados durante as intervenções. Os dados foram tratados estatisticamente com o teste t-independente, com nível de significância de 5%. Os resultados
obtidos evidenciaram que não houve diferenças significantes entre os grupos copo e mamadeira para nenhum dos parâmetros do estudo. Quanto o tempo total de atendimento fonoaudiológico obteve-se a média de 11 dias. No geral o peso ao nascimento médio dos
recém-nascidos foi cerca de 1500 gramas, com idade gestacional média de 32 semanas e 21 dias de vida e a coordenação S/D/R deu-se em média com 35,5 semanas de idade gestacional corrigida e 26 dias de vida. Os resultados deste estudo evidenciam que quando
há adequado acompanhamento fonoaudiológico visando o incentivo ao aleitamento materno, prematuros conseguem efetivamente sugar, deglutir e respirar de forma coordenada com média de 35,5 semanas, evidenciando o início do desenvolvimento do ser humano
em relação à alimentação no período intra-uterino, sendo possível uma alimentação via oral eficaz com idade gestacional corrigida igual ao bebê termo.

Dados de publicação
Página(s) : p.1641
URL (endereço digital) : http://www.sbfa.org.br/portal/suplementorsbfa